



LABORATOIRE ///AUDISTIMPHARMA

 FRANÇAIS

 NEDERLANDS

RONCHOSTIM® INFORMATION PRODUIT :

Indication : **anti-ronflement**

Spray Nasal

Instructions d'utilisation : avant le coucher, pulvériser la solution liquide dans les 2 narines en penchant la tête en arrière, jusqu'à sentir la solution dans la gorge. En général 4 à 6 pressions sur la pompe suffisent pour chaque narine. Pour un meilleur effet, ne pas manger ni boire après utilisation.

Mise en garde : employer seulement comme indiqué. Garder hors de portée des enfants.

Conseils d'utilisation :

- **Ronflements :**
4-6 pulvérisations au moment du coucher (une prise).
- **Épistaxis :**
2 pulvérisations dans chaque narine, 3 fois par jour.
- **Lubrification pré et post-opératoire :**
2 pulvérisations dans chaque narine, 3 fois par jour.
- **Sécheresses :**
Combiné à la sécheresse induite par les médicaments 4 pulvérisations dans chaque narine, 3 fois par jour.

Composition : Polysorbate 80, Glycerol 85%, Chlorure de Sodium, Edetate Sodium, Eau purifiée, Potassium Sorbate 0.15%

Un flacon de Ronchostim® contient 30 ml – 4 semaines d'utilisation.
Flacon scellé: ne pas utiliser si l'opercule de sécurité est endommagé.

RONCHOSTIM® PRODUCTINFORMATIE:

Aangewezen bij: **verlichting van snurken**

Neusspray

Gebruiksaanwijzing: voor u naar bed gaat, spuit u de vloeibare oplossing in beide neusgaten. Houd het hoofd achterover tot u de oplossing in de keel voelt. In het algemeen volstaat 4 tot 6 keer drukken op het pompje voor elk neusgat. Voor een beter effect, niet eten of drinken na gebruik.

Opgelet: enkel gebruiken zoals voorgeschreven. Buiten het bereik van kinderen houden.

Gebruiksaanwijzing:

- **Snurken:**
4-6 verstuiwingen voor het slapengaan (een shot).
- **Bloedende neus:**
2 verstuiwingen in elk neusgat, 3 keer per dag.
- **Pre- en postoperatief smeren:**
2 verstuiwingen in elk neusgat, 3 keer per dag.
- **Droogheid:**
In combinatie met de droogheid veroorzaakt door medicatie 4 verstuiwingen in elk neusgat, 3 keer per dag.

Amenstelling: Polysorbaat 80, glycerol 85%, natriumchloride, natriumedetaat, gezuiverd water, kaliumsorbaat 0,15%

Eén flacon Ronchostim® bevat 30 ml – 4 weken gebruik.
Verzegelde flacon: niet gebruiken wanneer het veiligheidszegel beschadigd is.



 Consulter les instructions d'utilisation
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
 Plage de température de stockage
Temperatuurbereik bij opslag

REF Référence catalogue
Catalogusreferentie
MD Dispositif médical
Medisch hulpmiddel

 Fabriqué en UE
Geproduceerd in de EU

Fabricant/Fabrikant: **TANNERMEDICO A/S**
DTU Science Park, Agern Alle 1, 2970 Horsholm, Danemark/Denemarken

Distributeur/ Verdelers: **/// AUDISTIMPHARMA**
BP 30026, 33601 Pessac Cedex, France/Frankrijk
Tél./Tel. : **+33 5 56 69 13 84** - Courriel/E-mail: **contact@audistimpharma.fr**
Site web/Website: **www.audistimpharma.com**

1.014 fl. oz./30 ml

/// AUDISTIMPHARMA



